



Ochrana dropa fúzatého na Slovensku LIFE05 NAT/SK/000115



SÚHRNNÁ SPRÁVA Z VÝSLEDKOV MONITORINGU DROPA FÚZATÉHO, PREDÁTOROV A RUŠIVÝCH FAKTOROV V CHVÚ SYSLŮVKÉ POLIA A CHVÚ LEHNICE ZA OBDOBIE 2005 - 2009



Jozef Chavko, Lucia Matejovičová (RPS), Marek Sádovský (ŠOP SR), Rastislav Rybanič,
Boris Maderič (SOS/BirdLife Slovensko)


Bratislava jún 2009
Riešitelia projektu



Poľovnícke
zdrúženie
Lehnice



Pri nocovaní dropy fúzaté často využívali poľné depresie (Obr. č. 2) situované pod úrovňou okolitého terénu, kde boli čiastočne kryté pred poveternostnými vplyvmi a v ktorých sa doslova stratili z dohľadu potenciálnych predátorov a človeka. Na nocoviskách sme nachádzali kôpky exkrementov a pozbierali sme tam často aj perie, ktoré sme uschovali na prípadné DNA analýzy. Najčastejšie sme zaznamenali nocoviská v EFP podľa prílohy 3 vyhlášky a všetky doterajšie výsledky preukázali, že pre dropa fúzatého je najdôležitejšou časťou CHVÚ. Pre dosiahnutie dostatočnej úrovne priaznivého stavu bude nevyhnutné sústrediť pozornosť a primárne aj uplatňovanie manažmentových opatrení najmä do tejto oblasti. Z viacerých poznatkov vyplýva, že vtáky nocujú na miestach, kde sa cítia najbezpečnejšie a tie miesta často využívajú aj na reprodukciu.



Obr. 2: Zistené nocoviská krdľov *Otis tarda* v rokoch 2007 - 2008 s číselným vyjadrením priorit ich využívania, číslom 1 začína najčastejšie využívané nocovisko.

